

LOS HYMENOPTERA DEL ÁMBAR DEL CRETÁCICO INFERIOR DE ÁLAVA (PAÍS VASCO, ESPAÑA)

Martínez-Delclòs, X.⁽¹⁾ Peñalver-Mollá, E.⁽²⁾ & Rasnitsyn, A.⁽³⁾

(1) Dept. Estratigrafía i Paleontologia, Fac. Geologia, Universitat de Barcelona,
Barcelona, España

(2) Dept. Geologia, Fac. Biologia, Universitat de València, València, España

(3) Paleontological Institute, Academy of Sciences of the USSR, Moscow, Russia

Los himenópteros son el segundo Orden de insectos más numeroso en el ámbar del Cretácico inferior de Álava y corresponden, mayoritariamente, a formas parásitas. Han sido determinadas cinco familias, pudiéndose agrupar todos los ejemplares en tres superfamilias: Diapriodea, Ceraphronoidea y Chalcidoidea.

El conjunto está dominado por las familias Scelionidae (Diapriodea) y Megaspilidae (Ceraphronoidea) y representan casi el 80% de todos los individuos hallados. El resto de familias aparecidas lo hacen con un número escaso de individuos.

Se tiene registro de la familia Serphitidae con dos géneros conocidos: Aposerphites y Serphites, y de la familia Mymaridae? entre los Diapriodea. También de la familia Trigonalidae entre los Ceraphronoidea y varios ejemplares de Chalcidoidea.

De las cinco familias determinadas en el ámbar de Álava: Scelionidae, Serphitidae y Trigonalidae ya habían sido encontradas en otros yacimientos de ámbar del Cretácico inferior, las otras dos se encuentran, juntamente con las primeras, en ámbares del Cretácico superior.

Es de destacar la ausencia, por el momento, de representantes de la familia Formicidae en el ámbar alavés.